

公開可能な代表的レジメンのみを掲載し、適宜更新いたします。(2019年6月版)

肺がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|---------------------------|----------|-----------------------|------|---------|---------|
| CDDP+CPT-11(SM) | シスプラチン | 60mg/m ² | div | d1 | 28 |
| | イリノテカン | 60mg/m ² | div | d1,8,15 | |
| CDDP+VP-16 | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | 28 |
| | エトポシド | 100mg/m ² | div | d1,2,3 | |
| CBDCA+VP-16 | エトポシド | 100mg/m ² | div | d1,2,3 | 21~28 |
| | カルボプラチン | AUC=5/body | div | d1 | |
| AMR | アムルビシン | 45mg/m ² | div | d1,2,3 | 21 |
| CDDP+PEM | ペメトレキセド | 500mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | シスプラチン | 75mg/m ² | div | d1 | |
| PEM | ペメトレキセド | 500mg/m ² | div | d1 | 21 |
| CBDCA+PAC(3W) | パクリタキセル | 200mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=6/body | div | d1 | |
| CDDP+GEM | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8 | |
| CDDP+VNR | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | ビノレルビン | 25mg/m ² | div | d1,8 | |
| CBDCA+Nab-PAC(アブラキサ ン) | カルボプラチン | AUC=6/body | div | d1 | 21 |
| | アブラキサン | 100mg/m ² | div | d1,8,15 | |
| Daily CBDCA+RT | カルボプラチン | 30mg/m ² | div | d1-5 | - |
| RAM +DOC | ラムシルマブ | 10mg/kg | div | d1 | 21 |
| | ドセタキセル | 60mg/m ² | div | d1 | |
| オブジーボ(肺) | ニボルマブ | 240mg/kg | div | d1 | 14 |
| キイトルーダ(肺) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | div | d1 | 21 |
| テセントリク | アテゾリズマブ | 1200mg/body | div | d1 | 21 |
| イミフィンジ | デュバルマブ | 10mg/kg | div | d1 | 14 |

乳がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|----------------------|----------------|-------------------------|------|--|---------|
| EC(90・600) | エピルビシン | 90mg/m ² | iv | d1 | 21 |
| | シクロホスファミド | 600mg/m ² | div | d1 | |
| dose-denseEC(90・600) | エピルビシン | 90mg/m ² | iv | d1 | 14 |
| | シクロホスファミド | 600mg/m ² | div | d1 | |
| | ペグフィルグラスチム | 3.6mg | 皮下注 | d3 | |
| FEC | エピルビシン | 75~100mg/m ² | iv | d1 | 21 |
| | フルオロウラシル | 500mg/m ² | div | d1 | |
| | シクロホスファミド | 500mg/m ² | div | d1 | |
| TC(乳癌) | ドセタキセル | 75mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | シクロホスファミド | 600mg/m ² | div | d1 | |
| ハーセプチン | トラスツズマブ | 初回4mg/kg・維持2mg/kg | div | d1 | 7 |
| ハーセプチン(3週毎投与) | トラスツズマブ | 初回8mg/kg・維持6mg/kg | div | d1 | 21 |
| ドセタキセル | ドセタキセル | 60~75mg/m ² | div | d1 | 21 |
| WT 12 | パクリタキセル | 80mg/m ² | div | d1,8,15,22,29,35, 43,50,57,64,71,78 | 91 |
| CMF | メソトレキセート | 40mg/m ² | div | d1,8 | 28 |
| | フルオロウラシル | 500mg/m ² | div | d1,8 | |
| | シクロホスファミド | 100mg | 経口 | d1-14 | |
| ナベルピン | ビノレルビン | 25mg/m ² | div | d1,8 | 21 |
| ジェムザール乳癌専用 | ゲムシタビン | 1250mg/m ² | div | d1,8 | 21 |
| ハラヴェン | エリブリン | 1.4mg/m ² | div | d1,8 | 21 |
| アブラキサン | アブラキサン | 260mg/m ² | div | d1 | 21 |
| アバスチン+パクリタキセル(90) | ベバシズマブ | 10mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| | パクリタキセル | 90mg/m ² | div | d1,8,15 | |
| カドサイラ | トラスツズマブ エムタンシン | 3.6mg/kg | div | d1 | 21 |

胃がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|--------------------|----------|-----------------------|------|---------|---------|
| DOC+TS-1 triweekly | ドセタキセル | 40mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | S-1 | 80mg/m ² | 経口 | 2投1休 | |
| TS-1+CDDP | シスプラチン | 60mg/m ² | div | d8 | 35 |
| | S-1 | 80mg/m ² | div | d1-21 | |
| SOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | S-1 | 80mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| Xeloda+CDDP/ハーセプチン | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カペシタビン | 2000mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| | トラスツズマブ | 初回8mg/kg・維持6mg/kg | div | d1 | |
| Xeloda+CDDP 3weeks | カペシタビン | 2000mg/m ² | 経口 | d1-14 | 21 |
| | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | |
| RAM+wPAC(80) | ラムシルマブ | 8mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| | パクリタキセル | 80mg/m ² | div | d1,8,15 | |
| RAM+アブラキサン | ラムシルマブ | 8mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| | アブラキサン | 100mg/m ² | div | d1,8,15 | |
| アブラキサン(胃癌) | アブラキサン | 100mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| オブジーボ(胃) | ニボルマブ | 240mg/kg | div | d1 | 14 |

食道がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|-------------------------------|----------|-----------------------|------|------|---------|
| 5FU+CDDP(CRT) 【FP 700/70】 | フルオロウラシル | 700mg/m ² | div | d1-4 | 28 |
| | シスプラチン | 70mg/m ² | div | d1 | |
| 5FU+CDDP(CRT) 【FP 1000/75】 | フルオロウラシル | 1000mg/m ² | div | d1-4 | 28 |
| | シスプラチン | 75mg/m ² | div | d1 | |
| FP | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | 28 |
| | フルオロウラシル | 800mg/m ² | div | d1-5 | |
| 5FU+Ned | フルオロウラシル | 800mg/m ² | div | d1-5 | 28 |
| | ネダプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | |
| DOC単独 | ドセタキセル | 60mg/m ² | div | d1 | 21 |
| DCF | フルオロウラシル | 750mg/m ² | div | d1-5 | 21 |
| | ドセタキセル | 70mg/m ² | div | d1 | |
| | シスプラチン | 70mg/m ² | div | d1 | |

大腸がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与法 | 投与日 | 1クール(日) |
|----------------|----------|----------------------------|-----|------------------|---------|
| 5FU/ILV | レボホリナート | 250mg/m ² | div | d1,8,15,22,29,36 | 56 |
| | フルオロウラシル | 600mg/m ² | div | d1,8,15,22,29,36 | |
| mFOLFOX6 | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | 14 |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400~3000mg/m ² | div | d1 | |
| アバスチン+mFOLFOX6 | ベバシズマブ | 5or10mg/kg | div | d1 | 14 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400~3000mg/m ² | div | d1 | |
| XELOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カペシタビン | 2000mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| アバスチン+XELOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | div | d1 | 21 |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | d1 | |
| | カペシタビン | 2000mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| SOX | オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | S-1 | 80mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| アバスチン+SOX | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | div | d1 | 21 |
| | オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | d1 | |
| | S-1 | 80mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| FOLFIRI | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | 14 |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|------------------|---------------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| アバスチン+FOLFIRI | ベバシズマブ | 5or 10mg/kg | div | d1 | 14 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |
| アバスチン+IRIS | ベバシズマブ | 5or 10mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| | イリノテカン | 100mg/m ² | div | d1,15 | |
| | S-1 | 80mg/m ² | 経口 | d1-14 | |
| アバスチン+mFOLFOXIRI | ベバシズマブ | 5mg/kg | div | d1 | 14 |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | div | d1 | |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | オキサリプラチン | 85mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |
| RAM+FOLFIRI | ラムシルマブ | 8mg/kg | div | d1 | 14 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |
| ザルトラップ+FOLFIRI | アフリベルセプトベータ | 4mg/kg | div | d1 | 14 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | イリノテカン | 150mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |
| ア-ビタックス | セツキシマブ | 初回: 400mg/m ² | div | d1 | 7 |
| | | 2回目以降: 250mg/m ² | | | |
| B-mab+ロンサーフ | ベバシズマブ | 5mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| | トリフルリジン・チピラシル | 80mg/m ² | 経口 | d1-5,8-12 | |

胆道がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|----------|--------|-----------------------|------|---------|---------|
| CDDP+GEM | シスプラチン | 25mg/m ² | div | d1,8 | 21 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8 | |
| GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |

膵がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|-------------|----------|-----------------------|------|---------|---------|
| FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85mg/m ² | div | d1 | 14 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | div | d1 | |
| | イリノテカン | 180mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 400mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 2400mg/m ² | div | d1 | |
| GEM+Nab-PAC | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| | アブラキサン | 125mg/m ² | div | d1,8,15 | |

婦人科がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|----------------|----------------|-----------------------|------|---------|---------|
| weekly CDDP | シスプラチン | 40mg/m ² | div | d1 | 7 |
| ノギテカン・シスプラチン | ノギテカン | 0.75mg/m ² | div | d1-3 | 21 |
| | シスプラチン | 50mg/m ² | div | d1 | |
| TC | パクリタキセル | 180mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5/body | div | d1 | |
| AP療法 | ドキシソルビシン | 60mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | シスプラチン | 50mg/m ² | div | d1 | |
| TC+アバスチン (TCB) | パクリタキセル | 180mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5/body | div | d1 | |
| | ベバシズマブ | 15mg/kg | div | d1 | |
| アバスチン単剤 | ベバシズマブ | 15mg/kg | div | d1 | 21 |
| DC | ドセタキセル | 70mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | カルボプラチン | AUC=5/body | div | d1 | |
| カンプト療法 | イリノテカン | 100mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| ドキシル | リポソーム化ドキシソルビシン | 40mg/m ² | div | d1 | 28 |
| ジェムザール単剤 | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| ハイカムチン | ノギテカン | 1.25mg/m ² | div | d1-5 | 21 |

泌尿器がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|---------------|------------|-----------------------|------|---------|---------|
| GC療法(28日コース) | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| | シスプラチン | 70mg/m ² | div | d1 | |
| キイトルーダ(尿路上皮癌) | ペムブロリズマブ | 200mg/body | div | d1 | 21 |
| ドセタキセル療法 | ドセタキセル | 75mg/m ² | div | d1 | 21 |
| カバジタキセル | カバジタキセル | 25mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | ペグフィルグラスチム | 3.6mg | 皮下注 | d3 | |
| BEP療法 | シスプラチン | 20mg/m ² | div | d1-5 | 21 |
| | エトポシド | 100mg/m ² | div | d1-5 | |
| | ブレオマイシン | 30mg(15mg)/body | iv | d1,8,15 | |
| オブジーボ | ニボルマブ | 240mg/kg | div | d1 | 14 |
| トーリセル療法 | テムシロリムス | 25mg/body | div | d1 | 7 |

造血器腫瘍

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与法 | 投与日 | 1クール(日) |
|------------------|----------|----------------------|-----|----------------|---------|
| ビダーザ | アザシチジン | 75mg/m ² | 皮下注 | d1-7 | 28 |
| ビダーザ(点滴静注) | アザシチジン | 75mg/m ² | div | d1-7 | 28 |
| ベルケイド | ボルテゾミブ | 1.3mg/m ² | div | d1,4,8,11 | 21 |
| カイトロリス① | カルフィルゾミブ | 20mg/m ² | div | d1,2 | 28 |
| | カルフィルゾミブ | 27mg/m ² | div | d8,9,15,16 | |
| カイトロリス②~⑫ | カルフィルゾミブ | 27mg/m ² | div | d1,2,8,9,15,16 | 28 |
| DBd療法① | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1,8,15 | 21 |
| | ボルテゾミブ | 1.3mg/m ² | 皮下注 | d1,4,8,11 | |
| DBd療法②~③ | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1,8,15 | 21 |
| | ボルテゾミブ | 1.3mg/m ² | 皮下注 | d1,4,8,11 | |
| DBd療法④~⑧ | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1 | 21 |
| | ボルテゾミブ | 1.3mg/m ² | 皮下注 | d1,4,8,11 | |
| DBd療法⑨以降 | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1 | 28 |
| DLd療法① | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1,8,15,22 | 28 |
| DLd療法② | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1,8,15,22 | 28 |
| DLd療法③~⑥ | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| DLd療法⑦以降 | ダラツムマブ | 16mg/kg | div | d1 | 28 |
| エムプリシティ①,② | エロツズマブ | 10mg/kg | div | d1,8,15,22 | 28 |
| エムプリシティ(E-Ld)③以降 | エロツズマブ | 10mg/kg | div | d1,15 | 28 |
| ABVD変法 | ドキソルビシン | 25mg/m ² | div | d1 | 14 |
| | ブレオマイシン | 9mg/m ² | div | d1 | |
| | ビンブラスチン | 6mg/m ² | iv | d1 | |
| | ダカルバジン | 375mg/m ² | div | d1 | |

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与法 | 投与日 | 1クール(日) |
|---|---------------|-----------------------|-----|------------------|---------|
| アドセトリス | ブレンツキシマブ・ベドチン | 1.8mg/kg | div | d1 | 21 |
| R(375mg/m ²)-CHOP (プレドニンは内服処方) | リツキシマブ | 375mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | ドキシソルビシン | 50mg/m ² | div | d2 | |
| | ビンクリスチン | 1.4mg/m ² | div | d2 | |
| | シクロホスファミド | 750mg/m ² | div | d2 | |
| CHOP (プレドニンは内服処方) | ドキシソルビシン | 50mg/m ² | div | d1 | 21 |
| | ビンクリスチン | 1.4mg/m ² | div | d1 | |
| | シクロホスファミド | 750mg/m ² | div | d1 | |
| ESHAP(R) | リツキシマブ | 375mg/m ² | div | d1 | 28 |
| | シスプラチン | 25mg/m ² | div | d2-5 | |
| | シタラビン | 2000mg/m ² | div | d6 | |
| | エトポシド | 40mg/m ² | div | d2-5 | |
| EPOCH (プレドニンは内服処方) | エトポシド | 50mg/m ² | div | d1-4 | 21 |
| | ドキシソルビシン | 10mg/m ² | | | |
| | ビンクリスチン | 0.4mg/m ² | | | |
| | シクロホスファミド | 750mg/m ² | div | d5 | |
| B-R | リツキシマブ | 375mg/m ² | div | d1 | 28 |
| | ベンダムスチン | 90mg/m ² | div | d2,3 | |
| トレアキシチン | ベンダムスチン | 120mg/m ² | div | d1,2 | 21 |
| GDP | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | div | d1,8 | 21 |
| | シスプラチン | 75mg/m ² | div | d1 | |
| ガザイバ+ベンダムスチン① | ベンダムスチン | 90mg/m ² | div | d1,2 | 28 |
| | オビヌツズマブ | 1000mg/body | div | d1,8,15 | |
| ガザイバ+ベンダムスチン②~⑥ | ベンダムスチン | 90mg/m ² | div | d1,2 | 28 |
| | オビヌツズマブ | 1000mg/body | div | d1 | |
| プララトレキセート(ジフォルタ) | プララトレキサート | 30mg/m ² | div | d1,8,15,22,29,36 | 49 |
| イストダックス | ロミデプシン | 14mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |

頭頸部がん

| レジメン名 | 抗がん剤 | 基準投与量 | 投与方法 | 投与日 | 1クール(日) |
|--------------------------------|----------|---|------|------------|---------|
| CDDP(100mg/m ²)CRT | シスプラチン | 100mg/m ² | div | d1 | 21 |
| アービタックス(初回)+CF (CDDP+5FU) | セツキシマブ | 初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ² | div | d1,8,15,22 | 28 |
| | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 800mg/m ² | div | d1-4 | |
| アービタックス(維持量)+CF (CDDP+5FU) | セツキシマブ | 250mg/m ² | div | d1,8,15,22 | 28 |
| | シスプラチン | 80mg/m ² | div | d1 | |
| | フルオロウラシル | 800mg/m ² | div | d1-4 | |
| オブジーボ | ニボルマブ | 240mg/kg | div | d1 | 14 |
| アービタックス(初回)+wPAC | パクリタキセル | 80mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| | セツキシマブ | 初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ² | div | d1,8,15,22 | |
| アービタックス+wPAC | パクリタキセル | 80mg/m ² | div | d1,8,15 | 28 |
| | セツキシマブ | 250mg/m ² | div | d1,8,15,22 | |