

## 【CapOX】テレフォントラッキングシート

患者氏名	生年月日	性別	男・女	コース数：	コース目
電話対応日時	(●電話予約時間 月 日 時) ※投与1週間前後を目安にお願いします。				
対応者	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 家族				
カペシタピンのアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回) <input type="checkbox"/> 不明 ( )				
支持療法のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回) <input type="checkbox"/> 不明 ( )				

<b>末梢神経障害</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		軽度の症状	ADLを制限する 中等度の症状	ADLができない 高度の症状	
<b>吐き気</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		吐き気あるが 今まで通り食べられる	吐き気あり 食事摂取量は減ったが 体重変化はない	吐き気あり 食事摂取ができない 水分摂取ができない	
<b>嘔吐</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		1-2回/日	3-4回/日	6回以上/日	
<b>食欲不振</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		食欲はないが 今まで通り食べられる	食量は減ったが 体重変化はない	食べられない 体重減少あり	
		食事摂取量減 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり → 食事摂取量 % (治療開始前と比較)			
<b>倦怠感</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		軽度のだるさ	家事、買物などの労作的なADLを 制限するだるさ	食事、入浴などの基本的な ADLを制限するだるさ	
<b>便秘</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		不定期または間欠的 (緩下剤の服用)	ADLを制限する便秘 (緩下剤定期服用を要する)	ADLができない便秘 (排便を要する)	
<b>下痢</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		ベースライン+4回未満	ベースライン+4~6回	ベースライン+7回以上	
		下痢症状 (回数: 回/日) 便の性状 (軟便・泥状・水様)			
<b>口内炎</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> Grade 1	<input type="checkbox"/> Grade 2	<input type="checkbox"/> Grade 3	発現時期・その他
		軽度の疼痛	食事内容の変更を要する 中等度の疼痛	経口摂取に支障のある 重度の疼痛	

<b>発熱 (37.5度以上)</b>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり (発現時期: ) :	<input type="checkbox"/> 緊急性あり	<input type="checkbox"/> 抗菌薬の使用
皮膚症状・爪変化	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり (心理的影響 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり)		
味覚障害	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり (食事摂取への影響 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり)		
間質性肺炎	<input type="checkbox"/> 空咳	<input type="checkbox"/> 発熱	<input type="checkbox"/> 労作時の息切れ	<input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> 緊急性あり
その他	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり (症状: )		

**Grade3 (患者に病院連絡を勧告) , Grade2 (トレーシングレポート)**

※テレフォントラッキングシートをトレーシングレポートに添付してください。

※緊急性がある場合は直接医師連絡、または受診勧告をしてください。