

◇ 大腸癌レジメン ◇

2020年9月現在

| レジメン名 | 適応癌種等 | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路： 施行日 | 1クール |
|---------------------------|-------|---|---|---|------|
| m-FOLFOX6療法 | 大腸癌 | レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| アレルギー対応用 m-FOLFOX6療法 | 大腸癌 | レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| m-FOLFOX6+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 or 10 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| アレルギー対応用 m-FOLFOX6+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 or 10 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| m-FOLFOX6+Pmab療法 | 大腸癌 | パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| アレルギー対応用 m-FOLFOX6+Pmab療法 | 大腸癌 | パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル | 6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| FOLFIRI療法 | 大腸癌 | レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル | 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--|--|---|-----|
| FOLFIRI+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 or 10 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| FORFIRI+Pmab療法 | 大腸癌 | パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル | 6 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 | 14日 |
| FOLFIRI+Ram療法 | 大腸癌 | ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル | 8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| FOLFIRI+Aflibercept療法 | 大腸癌 | アフリベルセプトベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル | 4 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| sLV5FU2療法 | 大腸癌 | レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| sLV5FU2+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル | 5 or 10 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| SOX療法 | 大腸癌 | オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 130 mg/m ² 80 mg/m ² | 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |
| SOX+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |
| XELOX療法 | 大腸癌 | オキサリプラチン カペシタビン | 130 mg/m ² 2000 mg/m ² | 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |
| XELOX+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン | 7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|---|-----|
| CPT-11単独療法 | 大腸癌 | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注： day1 | 14日 |
| CPT-11+Pmab療法 | 大腸癌 | パニツムマブ イリノテカン | 6 mg/kg 150 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 | 14日 |
| IRIS療法 | 大腸癌 | イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 125 mg/m ² 80-120 mg/body | 点滴静注： day1,15 経口投与： day1-14 | 28日 |
| IRIS+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 5 mg/kg 125 mg/m ² 80-120 mg/body | 点滴静注： day1,15 点滴静注： day1,15 経口投与： day1-14 | 28日 |
| IRIS+Pmab療法 | 大腸癌 | パニツムマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル | 6 mg/kg 150 mg/m ² 80 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1-7 | 14日 |
| XELIRI療法 | 大腸癌 | イリノテカン カペシタビン | 200 mg/m ² 2000 mg/m ² | 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |
| XELIRI+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン | 7.5 mg/kg 200 mg/m ² 2000 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝 | 21日 |
| FOLFOXIRI+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル | 5 mg/kg 165 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| FORFOXIRI+Bev維持療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル | 5 mg/kg 200 mg/m ² 3200 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 インフューザー： day1-3 | 14日 |
| Cetuximab単独療法 | 大腸癌 | セツキシマブ（初回） セツキシマブ（2回目以降） | 400 mg/m ² 250 mg/m ² | 点滴静注： day1 点滴静注： day1 | 7日 |
| Panitumumab単独療法 | 大腸癌 | パニツムマブ | 6 mg/kg | 点滴静注： day1 | 14日 |
| （TAS-102）+Bev療法 | 大腸癌 | ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル | 5 mg/kg 70 mg/m ² | 点滴静注： day1,15 経口投与： day1夕-6朝,8夕-13朝 | 28日 |