

# ◇ 大腸癌レジメン ◇

2022年6月現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1クール
m-FOLFOX6療法	大腸癌	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
アレルギー対応用 m-FOLFOX6療法	大腸癌	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
m-FOLFOX6+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 or 10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
アレルギー対応用 m-FOLFOX6+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 or 10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
m-FOLFOX6+Pmab療法	大腸癌	パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
アレルギー対応用 m-FOLFOX6+Pmab療法	大腸癌	パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日

FOLFIRI療法	大腸癌	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
FOLFIRI+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 or 10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
FORFIRI+Pmab療法	大腸癌	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1	14日
FOLFIRI+Ram療法	大腸癌	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
FOLFIRI+Aflibercept療法	大腸癌	アフリベルセプトベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
sLV5FU2療法	大腸癌	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
sLV5FU2+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5 or 10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 急速静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
SOX療法	大腸癌	オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日

SOX+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ オキサリプラチン テガフル・ギメラシル・オテラシル	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日
XELOX療法	大腸癌	オキサリプラチン カペシタビン	130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日
XELOX+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日
CPT-11単独療法	大腸癌	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1	14日
CPT-11+Pmab療法	大腸癌	パニツムマブ イリノテカン	6 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1	14日
IRIS療法	大腸癌	イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル	125 mg/m <sup>2</sup> 80-120 mg/body	点滴静注： day1,15 経口投与： day1-14	28日
IRIS+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル	5 mg/kg 125 mg/m <sup>2</sup> 80-120 mg/body	点滴静注： day1,15 点滴静注： day1,15 経口投与： day1-14	28日
IRIS+Pmab療法	大腸癌	パニツムマブ イリノテカン テガフル・ギメラシル・オテラシル	6 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1-7	14日
XELIRI療法	大腸癌	イリノテカン カペシタビン	200 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日
XELIRI+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1夕-15朝	21日
FOLFOXIRI+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	5 mg/kg 165 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 3200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 インフューザー： day1-3	14日
FORFOXIRI+Bev維持療法	大腸癌	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 3200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1 インフューザー： day1-3	14日

Cetuximab単独療法	大腸癌	セツキシマブ（初回） セツキシマブ（2回目以降）	400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day1	7日
エンコラフェニブ+セツキシマブ療法	大腸癌	セツキシマブ（初回） セツキシマブ（2回目以降） エンコラフェニブ	400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup> 300 mg	点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1-7	7日
Panitumumab単独療法	大腸癌	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注： day1	14日
（TAS-102）+Bev療法	大腸癌	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	5 mg/kg 70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,15 経口投与： day1夕-6朝,8夕-13朝	28日