

◇ 小児科レジメン ◇

2022年10月現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1クール
Triple-IT ALL (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 26 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
ALL 先行治療相 (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相 (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	7日
ALL-B12 寛解導入療法IA2 (1歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2 (2歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA4 (1歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA4 (2歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日

ALL-B12 寛解導入療法IA4 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 早期強化療法IB (1歳)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB (2歳)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB+L (2歳)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	42日
ALL-B12 早期強化療法IB+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day15,22 点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	42日

ALL-B12 強化療法M2 (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M2 (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5+L (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 12500 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート ビンクリスチン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 1.5 mg/m <sup>2</sup> 12500 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日

ALL-B12 強化療法HR3 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン エトポシド エトポシド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 100 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> × 2 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 点滴静注： day3 点滴静注： day4,5 筋注： day6,11 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-B12 強化療法HR2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	3 mg/m <sup>2</sup> 5000 mg/m <sup>2</sup> 800 mg/m <sup>2</sup> 800 mg/m <sup>2</sup> × 2 30 mg/m <sup>2</sup> 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 点滴静注： day5 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-B12 強化療法HR1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン シクロホスファミド シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 5000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 200 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> × 2 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ (1歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ (2歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日

ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L (2歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	35日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	35日
ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	8 mg 20 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	10 mg 26 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日

ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	12 mg 30 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 中間維持療法IM+VD	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 維持療法Mainte+VD	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	56日
ALL-B12 維持療法 (ハイリスク アームB 3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	12 mg 30 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	56日
ALL-T11 寛解導入療法IA (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 筋注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-T11 早期強化療法IB+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日
ALL-T11 強化療法M+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m <sup>2</sup> 12500 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-T11 強化療法NEL 全年齢	急性リンパ性白血病	ネララビン	650 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5	7日
ALL-T11 強化療法HR3 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン エトポシド エトポシド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 100 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> × 2 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 点滴静注： day3 点滴静注： day4,5 筋注： day6,11 髄注： day5 髄注： day5	14日

ALL-T11 強化療法HR2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	3 mg/m <sup>2</sup> 5000 mg/m <sup>2</sup> 800 mg/m <sup>2</sup> 800 mg/m <sup>2</sup> × 2 30 mg/m <sup>2</sup> 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 点滴静注： day5 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-T11 強化療法HR1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン シクロホスファミド シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 5000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 200 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> × 2 25000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-T11 再寛解導入療法IIA+L (全年齢)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ドキシソルビシン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup>	静注： day8,15,22,29 点滴静注： day8,15,22,29 筋注： day8,11,15,18	35日
ALL-T11 再寛解導入療法IIB+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 筋注： day1,4,8,11 静注： day3-6,10-13 髄注： day3,10 髄注： day3,10 経口投与： day1-14	14日
ALL-T19 寛解導入療法IA (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 筋注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-T19 早期強化療法IB (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup> 5000 U/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日

ALL-Ph13 再寛解導入療法Ⅲ (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ドキシソルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day22 静注： day24-27,31-34 髄注： day24,31 髄注： day24,31 経口投与： day22-35	42日
JACLS ALL-02 強化療法 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン シクロホスファミド ピラルビシン メトトレキサート シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,3,5 点滴静注： day1,2 髄注： day1,8 髄注： day1,8	28日
JACLS ALL-02 聖域療法 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day2,9 髄注： day2,9	14日
JACLS ALL-02 再寛解導入療法 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ピラルビシン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 6000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15 点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,3,5,8,10,12 髄注： day1 髄注： day1	21日
JACLS ALL-02 再地固め療法 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン シクロホスファミド ピラルビシン メトトレキサート シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,3,5 点滴静注： day1,2 髄注： day1,8 髄注： day1,8	28日
JACLS ALL-02 維持療法#1 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	150 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 50 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,15,29 髄注： day1,15,29 髄注： day1,15,29 経口投与： day1-28	42日
JACLS ALL-02 維持療法#2 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup>	静注： day1,8,15 点滴静注： day8 筋注： day1,8,15	28日
JACLS ALL-02 維持療法#3 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	150 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 50 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,15,29 髄注： day29 髄注： day29 経口投与： day1-28	42日



JACLS ALL-02 維持療法#4 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ピラルビシン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup>	静注： day1,8,15 点滴静注： day8 筋注： day1,8,15	28日
JACLS ALL-02 維持療法#5 (ハイリスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メルカプトプリン	150 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,15,29 経口投与： day1-28	42日
MLL-10 早期強化療法B (3ヶ月以上1歳未満)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	400 mg/m <sup>2</sup> 3600 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> × 2 6000 U/m <sup>2</sup> 6 mg 15 mg	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 点滴静注： day15-19 点滴静注： day15-19 点滴静注： day29,31 点滴静注： day30 筋注： day31 髄注： day1,8 髄注： day1,8	35日
MLL-10 維持療法B- I サイクル#1,3,5 (1歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	0.05 mg/kg 20 mg/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 75 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 静注： day8,15,22 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day8-28	28日
MLL-10 維持療法B- I サイクル#2,4 (1歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	0.05 mg/kg 20 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> × 2 6000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	静注： day1 静注： day8,15 点滴静注： day22-26 点滴静注： day22-26 点滴静注： day43,45 点滴静注： day44 筋注： day45 髄注： day1 髄注： day1	49日
MLL-10 後期強化療法B (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	400 mg/m <sup>2</sup> 3600 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> × 2 6000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 点滴静注： day15-19 点滴静注： day15-19 点滴静注： day29,31 点滴静注： day30 筋注： day31 髄注： day1 髄注： day1	42日

MLL-10 維持療法B-II (2歳)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート メルカプトプリン	0.05 mg/kg 10 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,29,57 髄注： day1 経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78 経口投与： day8-28,36-56,64-84	84日
MLL-10 維持療法B-II (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート メルカプトプリン	0.05 mg/kg 12 mg 20 mg/m <sup>2</sup> 75 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,29,57 髄注： day1 経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78 経口投与： day8-28,36-56,64-84	84日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 6 mg 16 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> × 2 10000 U/m <sup>2</sup> 6 mg 16 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> × 2 10000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日

ALL-R08 寛解導入療法F2 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 6 mg 16 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日

ALL-R08 強化療法R2 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 35 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 6 mg 16 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 35 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 8 mg 20 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 35 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 10 mg 26 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 35 mg/m <sup>2</sup> 10000 U/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
hyper CVAD療法 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンクリスチン シクロホスファミド ドキソルビシン メトトレキサート シタラビン	2 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/m <sup>2</sup> × 2 50 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	静注： day4,11 点滴静注： day1-3 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	21日

HD-MTX+AraC療法 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m <sup>2</sup> 3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 12 mg 30 mg 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day2,3 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-21	21日
Clofarabine+VP+CY療法	急性リンパ性白血病 (再発)	クロファラビン エトポシド シクロホスファミド	40 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 440 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5	28日
プリナツモマブ療法	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	プリナツモマブ	9 μg 28 μg	点滴静注： day1-7 点滴静注： day8-28	42日
FLU+MEL180療法	造血幹細胞移植前処置	メルファラン フルダラビン	90 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day3,4 点滴静注： day1-5	10日
FLU+BU+CY療法	移植前処置	フルダラビン ブスルファン シクロホスファミド	25 mg/m <sup>2</sup> 4 mg/kg(9kg未満) 4.8 mg/kg(9kg以上16kg未満) 4.4 mg/kg(16kg以上23kg以下) 3.8 mg/kg(23kg超34kg以下) 3.2 mg/kg(34kg超) 14.5 mg/kg	点滴静注： day2-6 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day5-6	6日
Short-term MTX療法	移植後GVHD予防	メトトレキサート メトトレキサート	15 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 静注： day3,6,11	11日
PTCY療法	移植後GVHD予防	シクロホスファミド	50 mg/kg	点滴静注： day1-2	2日
Low-dose MTX療法	移植後GVHD治療	メトトレキサート	10 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1	3日
Triple-IT AML (3ヶ月未満)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	3 mg 6 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	6 mg 15 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML (1歳)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML (2歳)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 25 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML (3歳以上)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 寛解導入療法1A ECM (3ヶ月未満)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	3.3 mg/kg 0.11 mg/kg 4.4 mg/kg 3 mg 6 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日

AML-12 寛解導入療法1A ECM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	3.3 mg/kg 0.11 mg/kg 4.4 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日
AML-12 寛解導入療法1A ECM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	150 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	28日
AML-12 寛解導入療法2 HCE I (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	100 mg/kg×2 0.33 mg/kg 3.3 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 寛解導入療法2 HCE I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法1 HCM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	66.7 mg/kg×2 0.17 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法1 HCM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 5 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法2 HCE I (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	100 mg/kg×2 0.33 mg/kg 3.3 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法2 HCE I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日

AML-12 強化療法3 HCM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	66.7 mg/kg×2 0.17 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法3 HCM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> ×2 5 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-P05 寛解導入療法第1相 ACD (2歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ダウノマイシン トレチノイン	200 mg/m <sup>2</sup> 45 mg/m <sup>2</sup> 45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day8-14 点滴静注： day8-10 経口投与： day1-35	35日
AML-P05 寛解導入療法第2相 HCMA-I (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第1相 HCMA- II (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m <sup>2</sup> ×2 10 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第2相 CTA- I (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ピラルビシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m <sup>2</sup> 45 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day6-12	12日
AML-P05 強化療法第3相 CTA- II (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ピラルビシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m <sup>2</sup> 45 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg 45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day6-12	12日
少量シタラビン療法	急性骨髄性白血病	シタラビン	3 mg/kg	静注： day1-3	3日
FLAG療法	急性骨髄性白血病 (再発)	フルダラビン シタラビン	30 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5	28日
FLAG-Ida療法	急性骨髄性白血病 (再発)	フルダラビン イダルビシン シタラビン	30 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 点滴静注： day1-5	28日
Low dose VP+AraC療法	白血病 (難治)	シタラビン エトポシド	20 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-7 点滴静注： day1-7	7日

CHOP療法	悪性リンパ腫	ビンクリスチン ドキシソルピシン シクロホスファミド プレドニゾロン	1.4 mg/m <sup>2</sup> 50 mg/m <sup>2</sup> 750 mg/m <sup>2</sup> 40or60 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1-5	21日
ICE療法	悪性リンパ腫	エトポシド カルボプラチン イホスファミド	100 mg/m <sup>2</sup> 5 AUC 5000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-3 点滴静注： day2 点滴静注： day2	21日
B-NHL03 コースP (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	ビンクリスチン シクロホスファミド メトトレキサート	1 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 12 mg	静注： day3 点滴静注： day4-6 髄注： day1	7日
B-NHL03 コース2A (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート ビンクリスチン シクロホスファミド ピラルピシン メトトレキサート	3000 mg/m <sup>2</sup> 1.5 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 12 mg	点滴静注： day1 静注： day2 点滴静注： day2-4 点滴静注： day3,4 髄注： day1	7日
B-NHL03 コース2B (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート	500 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 12 mg	点滴静注： day1 点滴静注： day1-4 髄注： day1	7日
ALCL99コースP (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	シクロホスファミド メトトレキサート シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup> 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 髄注： day1 髄注： day1	5日
ALCL99コースAM	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ イホスファミド シタラビン エトポシド	3 g/m <sup>2</sup> 15 mg/m <sup>2</sup> 800 mg/m <sup>2</sup> × 3 150 mg/m <sup>2</sup> × 3 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 静注： day2,3 点滴静注： day1-5 点滴静注： day4,5 点滴静注： day4,5	21日
LCH-12 寛解導入相A	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ビンクリスチン	100 mg/m <sup>2</sup> 1.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5,15-19,29-33 静注： day1,15,29	42日
LCH-12 早期維持相A-a	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ビンクリスチン	150 mg/m <sup>2</sup> 1.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 静注： day1	7日
LCH-12 早期維持相A-b	ランゲルハンス細胞組織球症	メトトレキサート ビンクリスチン	20 mg/m <sup>2</sup> 1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 静注： day1	7日
LCH-12 後期維持相C-a	ランゲルハンス細胞組織球症	ビンブラスチン メルカプトプリン	6 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 経口投与： day1-14	14日
HLH-2004 初期治療相 週2回 (1-2週目)	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,4	7日
HLH-2004 初期治療相 週1回 (3-8週目)	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1	7日
AZA点滴静注療法	骨髄異形成症候群	アザシチジン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-7	28日
JEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド カルボプラチン ブレオマイシン	120 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 15 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-3 点滴静注： day2 静注： day3	21日



PEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	100 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup> 15 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 点滴静注： day1	21日
DD-4A療法 (BW30kg未満)	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ビンクリスチン ビンクリスチン ドキシソルビシン ドキシソルビシン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg 1.5 mg/kg 1 mg/kg	静注： day1,38,80,122,164 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122,143,164 静注： day17,59 静注： day101,143	168日
EE-4A療法 (BW30kg未満)	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ビンクリスチン ビンクリスチン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg	静注： day1,17,38,59,80,101,122 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122	126日
DXR+IFM療法	軟部腫瘍	ドキシソルビシン イホスファミド	30 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,2 点滴静注： day1-5	21日
Low-dose CITA療法 (JPLT新標準リスク)	肝芽腫	シスプラチン ピラルビシン	80 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1 点滴静注： day2,3	21日
James療法	神経芽腫	ビンクリスチン シクロホスファミド	1.5 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/m <sup>2</sup>	静注： day1 点滴静注： day8	14日
RTX療法	難治性ネフローゼ症候群	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1,8,15,22	28日
エンドキサンプルス療法	全身性エリテマトーデス	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注： day1	30日
インフリキシマブ療法	潰瘍性大腸炎	インフリキシマブ	5 mg/kg	点滴静注： day1,15,43 以後8週間隔	