◇ 小児科レジメン ◇

2024年3月現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1クール
Triple-IT ALL（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 26 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
MTX-IT ALL(3歳以上9歳未満)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	5日
MTX-IT ALL(9歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	15 mg	髄注： day1	5日
ALL 先行治療相（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	7日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（2歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 10 mg 26 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA4（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日

ALL-B12 寛解導入療法IA4（2歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	28日
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15,22	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day5,26	
		シタラビン	26 mg	髄注： day5,26	
ALL-B12 寛解導入療法IA4（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	28日
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15,22	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5,26	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5,26	
ALL-B12 早期強化療法IB（1歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	20 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	
ALL-B12 早期強化療法IB（2歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	26 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	
ALL-B12 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	
ALL-B12 早期強化療法IB+L（2歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	42日
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	26 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	
ALL-B12 早期強化療法IB+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	

ALL-B12 早期強化療法IB+VL（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day15,22	42日
		シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day10,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-28	
ALL-B12 強化療法M2（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	2000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	20 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M2（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	2000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	26 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	2000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	30 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M5（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	20 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M5（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	26 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M5（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	30 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法M5+L（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		L-アスパラギナーゼ	12500 U/㎡	筋注： day10,24,38,52	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	26 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	

ALL-B12 強化療法M5+VL（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day8,22,36,50	
		L-アスパラギナーゼ	12500 U/㎡	筋注： day10,24,38,52	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	30 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 強化療法HR3（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン	2000 mg/㎡×2	点滴静注： day1,2	14日
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day3	
		エトポシド	100 mg/㎡×2	点滴静注： day4,5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5	
ALL-B12 強化療法HR2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンデシン	3 mg/㎡	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day1	
		イホスファミド	800 mg/㎡	点滴静注： day2	
		イホスファミド	800 mg/㎡×2	点滴静注： day3,4	
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-B12 強化療法HR1（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/㎡×2	点滴静注： day5	
		シクロホスファミド	200 mg/㎡	点滴静注： day2	
		シクロホスファミド	200 mg/㎡×2	点滴静注： day3,4	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	28日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	20 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	

ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ（2歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	28日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	26 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	28日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L（2歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	35日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	26 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	28日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	

ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+VL（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	35日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day15	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day17,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day17,24	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day15-28	
ALL-B12 中間維持療法IM（中間リスク1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	8 mg	髄注： day1,29	70日
		シタラビン	20 mg	髄注： day1,29	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 中間維持療法IM（中間リスク2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	10 mg	髄注： day1,29	70日
		シタラビン	26 mg	髄注： day1,29	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 中間維持療法IM（中間リスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1,29	70日
		シタラビン	30 mg	髄注： day1,29	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 中間維持療法IM+VD	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,29	70日
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 維持療法Mainte+VD	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,29	56日
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B12 維持療法（ハイリスク アームB 3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	56日
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B19 寛解導入療法IA2（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	28日
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day5,26	
		シタラビン	20 mg	髄注： day5,26	

ALL-B19 寛解導入療法IA2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B19 寛解導入療法IA4（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/㎡ 30 mg/㎡ 5000 U/㎡ 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B19 早期強化療法IB（1歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/㎡ 75 mg/㎡ 8 mg 20 mg 60 mg/㎡	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B19 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メルカプトプリン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/㎡ 75 mg/㎡ 60 mg/㎡ 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 経口投与： day1-28 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日
ALL-B19 強化療法M（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3 g/㎡ 8 mg 20 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day1,8 髄注： day1,8	14日
ALL-B19 強化療法M（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3 g/㎡ 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day1,8 髄注： day1,8	14日
ALL-B19 強化療法M2（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2 g/㎡ 8 mg 20 mg 25 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B19 強化療法M2（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2 g/㎡ 10 mg 26 mg 25 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B19 強化療法M2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2 g/㎡ 12 mg 30 mg 25 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日

ALL-B19 強化療法M5（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	30 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-B19 再寛解導入療法ⅡA	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day8,15,22,29	35日
		ドキソルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day8,15,22,29	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day8,11,15,18	
ALL-B19 再寛解導入療法ⅡB（2歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1	28日
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-day14	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day3,10	
		シタラビン	26 mg	髄注： day3,10	
ALL-B19 再寛解導入療法ⅡB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1	28日
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-day14	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day3,10	
		シタラビン	30 mg	髄注： day3,10	
ALL-T11 寛解導入療法IA（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	28日
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15,22	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day5,8,11,14,17,20,23,26	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5,26	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5,26	
ALL-T11 早期強化療法IB+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day10,24	
ALL-T11 強化療法M+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day8,22,36,50	70日
		L-アスパラギナーゼ	12500 U/㎡	筋注： day10,24,38,52	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day8,22,36,50	
		シタラビン	30 mg	髄注： day8,22,36,50	
		メルカプトプリン	25 mg/㎡	経口投与： day1-56	
ALL-T11 強化療法NEL 全年齢	急性リンパ性白血病	ネララビン	650 mg/㎡	点滴静注： day1-5	7日
ALL-T11 強化療法HR3（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン	2000 mg/㎡×2	点滴静注： day1,2	14日
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day3	
		エトポシド	100 mg/㎡×2	点滴静注： day4,5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5	

ALL-T11 強化療法HR2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンデシン	3 mg/㎡	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day1	
		イホスファミド	800 mg/㎡	点滴静注： day2	
		イホスファミド	800 mg/㎡×2	点滴静注： day3,4	
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-T11 強化療法HR1（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/㎡×2	点滴静注： day5	
		シクロホスファミド	200 mg/㎡	点滴静注： day2	
		シクロホスファミド	200 mg/㎡×2	点滴静注： day3,4	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-T11 再寛解導入療法ⅡA+L（全年齢）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day8,15,22,29	35日
		ドキソルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day8,15,22,29	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day8,11,15,18	
ALL-T11 再寛解導入療法ⅡB+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1	14日
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day3,10	
		シタラビン	30 mg	髄注： day3,10	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day1-14	
ALL-T19 寛解導入療法IA（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15,22	28日
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8,15,22	
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day5,8,11,14,17,20,23,26	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5,26	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5,26	
ALL-T19 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	1000 mg/㎡	点滴静注： day1,29	35日
		L-アスパラギナーゼ	5000 U/㎡	筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day3-6,10-13,17-20,24-27	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day10,24	
		シタラビン	30 mg	髄注： day10,24	
ALL-T19 強化療法NEL（全年齢）	急性リンパ性白血病	ネララビン	650 mg/㎡	点滴静注： day1- 5	7日

ALL-T19 強化療法HR3（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン	2000 mg/㎡×2	点滴静注： day1,2	14日
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day3	
		エトポシド	100 mg/㎡×2	点滴静注： day4,5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5	
ALL-T19 強化療法HR2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンデシン	3 mg/㎡	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	5000 mg/㎡	点滴静注： day1	
		イホスファミド	800 mg/㎡	点滴静注： day2	
		イホスファミド	800 mg/㎡×2	点滴静注： day3,4	
		ダウノルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	25000 U/㎡	筋注： day6,11	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-Ph13 再寛解導入療法Ⅲ（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8	42日
		ドキソルビシン	30 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,4,8,11	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day22	
		シタラビン	75 mg/㎡	静注： day24-27,31-34	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day24,31	
		シタラビン	30 mg	髄注： day24,31	
		メルカプトプリン	60 mg/㎡	経口投与： day22-35	
JACLS ALL-02 強化療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン	100 mg/㎡	点滴静注： day1-5	28日
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day1,3,5	
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,2	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1,8	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1,8	
JACLS ALL-02 聖域療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	3000 mg/㎡	点滴静注： day1,8	14日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day2,9	
		シタラビン	30 mg	髄注： day2,9	
JACLS ALL-02 再寛解導入療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15	21日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		L-アスパラギナーゼ	6000 U/㎡	筋注： day1,3,5,8,10,12	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	

JACLS ALL-02 再地固め療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン	100 mg/㎡	点滴静注： day1-5	28日
		シクロホスファミド	500 mg/㎡	点滴静注： day1,3,5	
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day1,2	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1,8	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1,8	
JACLS ALL-02 維持療法#1（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	150 mg/㎡	静注： day1,15,29	42日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1,15,29	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1,15,29	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-28	
JACLS ALL-02 維持療法#2（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15	28日
		シクロホスファミド	600 mg/㎡	点滴静注： day8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,8,15	
JACLS ALL-02 維持療法#3（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	150 mg/㎡	静注： day1,15,29	42日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day29	
		シタラビン	30 mg	髄注： day29	
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-28	
JACLS ALL-02 維持療法#4（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1,8,15	28日
		ピラルビシン	25 mg/㎡	点滴静注： day8	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/㎡	筋注： day1,8,15	
JACLS ALL-02 維持療法#5（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	150 mg/㎡	静注： day1,15,29	42日
		メルカプトプリン	50 mg/㎡	経口投与： day1-28	
MLL-10 早期強化療法B（3ヶ月以上1歳未満）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	400 mg/㎡	点滴静注： day1,8	35日
		メトトレキサート	3600 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		シクロホスファミド	300 mg/㎡	点滴静注： day15-19	
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day15-19	
		シタラビン	3000 mg/㎡	点滴静注： day29,31	
		シタラビン	3000 mg/㎡×2	点滴静注： day30	
		L-アスパラギナーゼ	6000 U/㎡	筋注： day31	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1,8	
		シタラビン	15 mg	髄注： day1,8	
MLL-10 維持療法B-Ⅰ サイクル#1,3,5（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	0.05 mg/kg	静注： day1	28日
		メトトレキサート	20 mg/㎡	静注： day8,15,22	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day8-28	

MLL-10 維持療法B-Ⅰサイクル#2,4（1歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	0.05 mg/kg	静注： day1	49日
		メトトレキサート	20 mg/㎡	静注： day8,15	
		シクロホスファミド	300 mg/㎡	点滴静注： day22-26	
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day22-26	
		シタラビン	3000 mg/㎡	点滴静注： day43,45	
		シタラビン	3000 mg/㎡×2	点滴静注： day44	
		L-アスパラギナーゼ	6000 U/㎡	筋注： day45	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	
MLL-10 後期強化療法B（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	400 mg/㎡	点滴静注： day1,8	42日
		メトトレキサート	3600 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		シクロホスファミド	300 mg/㎡	点滴静注： day15-19	
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day15-19	
		シタラビン	3000 mg/㎡	点滴静注： day29,31	
		シタラビン	3000 mg/㎡×2	点滴静注： day30	
		L-アスパラギナーゼ	6000 U/㎡	筋注： day31	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	
MLL-10 維持療法B-Ⅱ（2歳）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	0.05 mg/kg	静注： day1,29,57	84日
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78	
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day8-28,36-56,64-84	
MLL-10 維持療法B-Ⅱ（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	0.05 mg/kg	静注： day1,29,57	84日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78	
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day8-28,36-56,64-84	
ALL-R08 寛解導入療法F1（1歳未満）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	16 mg	髄注： day1	
ALL-R08 寛解導入療法F1（1歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	

ALL-R08 寛解導入療法F1（2歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	
		シタラビン	26 mg	髄注： day1	
ALL-R08 寛解導入療法F1（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALL-R08 寛解導入療法F2（1歳未満）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1	14日
		シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1,2	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day5	
		シタラビン	16 mg	髄注： day5	
ALL-R08 寛解導入療法F2（1歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1	14日
		シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1,2	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day5	
		シタラビン	20 mg	髄注： day5	
ALL-R08 寛解導入療法F2（2歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1	14日
		シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1,2	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day5	
		シタラビン	26 mg	髄注： day5	
ALL-R08 寛解導入療法F2（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1	14日
		シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1,2	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day5	
		シタラビン	30 mg	髄注： day5	
ALL-R08 強化療法R1（1歳未満）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/m²×2	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	16 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	

ALL-R08 強化療法R1（1歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/m²×2	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
ALL-R08 強化療法R1（2歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/m²×2	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	
		シタラビン	26 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
ALL-R08 強化療法R1（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,6	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		シタラビン	2000 mg/m²×2	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
ALL-R08 強化療法R2（1歳未満）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンデシン	3 mg/m²	静注： day1	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		イホスファミド	400 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		ダウノルビシン	35 mg/m²	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	16 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
ALL-R08 強化療法R2（1歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンデシン	3 mg/m²	静注： day1	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		イホスファミド	400 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		ダウノルビシン	35 mg/m²	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	
		シタラビン	20 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	

ALL-R08 強化療法R2（2歳）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンデシン	3 mg/m²	静注： day1	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		イホスファミド	400 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		ダウノルビシン	35 mg/m²	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	
		シタラビン	26 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
ALL-R08 強化療法R2（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンデシン	3 mg/m²	静注： day1	14日
		メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	
		イホスファミド	400 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		ダウノルビシン	35 mg/m²	点滴静注： day5	
		L-アスパラギナーゼ	10000 U/m²	点滴静注： day6	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	100 mg/m²	経口投与： day1-5	
AALL1331 conti.1/2 d1-d42	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	静注： day1	42日
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day1-42	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day8,15,29,36	
		メトトレキサート	25 mg/㎡×4	経口投与： day22	
AALL1331 conti.1/2 d43-d56	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド	300 mg/㎡	点滴静注： day1,8	14日
		エトポシド	150 mg/㎡	点滴静注： day1,8	
		シタラビン	50 mg/㎡	静注： day2-5,9-12	
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day1-7	
AALL1331 maintenance	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン	1.5 mg/㎡	点滴静注： day1,29,57	84日
		メルカプトプリン	75 mg/㎡	経口投与： day1-84	
		メトトレキサート	20 mg/㎡	経口投与： day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78	
hyper CVAD療法（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ビンクリスチン	2 mg/m²	静注： day4,11	21日
		シクロホスファミド	300 mg/m²×2	点滴静注： day1-3	
		ドキソルビシン	50 mg/m²	点滴静注： day4	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
HD-MTX+AraC療法（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	メトトレキサート	1000 mg/m²	点滴静注： day1	21日
		シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day2,3	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
		メルカプトプリン	60 mg/m²	経口投与： day1-21	
Clofarabine+VP+CY療法	急性リンパ性白血病（再発）	クロファラビン	40 mg/m²	点滴静注： day1-5	28日
		エトポシド	100 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		シクロホスファミド	440 mg/m²	点滴静注： day1-5	

ブリナツモマブ療法（45kg以上）（1サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	9 μg 28 μg	点滴静注： day1-7 点滴静注： day8-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg以上）（2-5サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	28 μg	点滴静注： day1-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg未満）（1サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	5 μg/㎡ 15 μg/㎡	点滴静注： day1-7 点滴静注： day8-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg未満）（2-5サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	15 μg	点滴静注： day1-28	42日
FLU+MEL180療法	造血幹細胞移植前処置	メルファラン フルダラビン	90 mg/m² 30 mg/m²	点滴静注： day3,4 点滴静注： day1-5	10日
FLU+BU+CY療法	移植前処置	フルダラビン ブスルファン シクロホスファミド	25 mg/m² 4 mg/kg(9kg未満) 4.8 mg/kg(9kg以上16kg未満) 4.4 mg/kg(16kg以上23kg以下) 3.8 mg/kg(23kg超34kg以下) 3.2 mg/kg(34kg超) 14.5 mg/kg	点滴静注： day2-6 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day5-6	6日
Short-term MTX療法	移植後GVHD予防	メトトレキサート メトトレキサート	15 mg/m² 10 mg/m²	静注： day1 静注： day3,6,11	11日
PTCY療法	移植後GVHD予防	シクロホスファミド	50 mg/kg	点滴静注： day1-2	2日
Low-dose MTX療法	移植後GVHD治療	メトトレキサート	10 mg/m²	静注： day1	3日
Triple-IT AML（3ヶ月未満）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	3 mg 6 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	6 mg 15 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（1歳）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（2歳）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 25 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（3歳以上）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 寛解導入療法1A ECM（3ヶ月未満）	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	3.3 mg/kg 0.11 mg/kg 4.4 mg/kg 3 mg 6 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日

AML-12 寛解導入療法1A ECM（3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	エトポシド	3.3 mg/kg	点滴静注： day1-5	12日
		ミトキサントロン	0.11 mg/kg	点滴静注： day6-10	
		シタラビン	4.4 mg/kg	点滴静注： day6-12	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	15 mg	髄注： day1	
AML-12 寛解導入療法1A ECM（3歳以上）	急性骨髄性白血病	エトポシド	150 mg/m²	点滴静注： day1-5	28日
		ミトキサントロン	5 mg/m²	点滴静注： day6-10	
		シタラビン	200 mg/m²	点滴静注： day6-12	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
AML-12 寛解導入療法2 HCE I （3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	シタラビン	100 mg/kg×2	点滴静注： day1-3	5日
		イダルビシン	0.33 mg/kg	点滴静注： day1	
		エトポシド	3.3 mg/kg	点滴静注： day1-5	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	15 mg	髄注： day1	
AML-12 寛解導入療法2 HCE I （3歳以上）	急性骨髄性白血病	シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1-3	5日
		イダルビシン	10 mg/m²	点滴静注： day1	
		エトポシド	100 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
AML-12 強化療法1 HCM（3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	シタラビン	66.7 mg/kg×2	点滴静注： day1-5	5日
		ミトキサントロン	0.17 mg/kg	点滴静注： day1-3	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	15 mg	髄注： day1	
AML-12 強化療法1 HCM（3歳以上）	急性骨髄性白血病	シタラビン	2000 mg/m²×2	点滴静注： day1-5	5日
		ミトキサントロン	5 mg/m²	点滴静注： day1-3	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
AML-12 強化療法2 HCE I （3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	シタラビン	100 mg/kg×2	点滴静注： day1-3	5日
		イダルビシン	0.33 mg/kg	点滴静注： day1	
		エトポシド	3.3 mg/kg	点滴静注： day1-5	
		メトトレキサート	6 mg	髄注： day1	
		シタラビン	15 mg	髄注： day1	
AML-12 強化療法2 HCE I （3歳以上）	急性骨髄性白血病	シタラビン	3000 mg/m²×2	点滴静注： day1-3	5日
		イダルビシン	10 mg/m²	点滴静注： day1	
		エトポシド	100 mg/m²	点滴静注： day1-5	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	

AML-12 強化療法3 HCM（3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	66.7 mg/kg×2 0.17 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法3 HCM（3歳以上）	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m²×2 5 mg/m² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-P05 寛解導入療法第1相 ACD（2歳以上）	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ダウノマイシン トレチノイン	200 mg/m² 45 mg/m² 45 mg/㎡	点滴静注： day8-14 点滴静注： day8-10 経口投与： day1-35	35日
AML-P05 寛解導入療法第2相 HCMA-I（3歳以上）	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m²×2 10 mg/m² 12 mg 30 mg 45 mg/㎡	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第1相 HCMA-Ⅱ（3歳以上）	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m²×2 10 mg/m² 12 mg 30 mg 45 mg/㎡	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第2相 CTA-Ⅰ（3歳以上）	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ピラルビシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m² 45 mg/m² 12 mg 30 mg 45 mg/㎡	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day6-12	12日
AML-P05 強化療法第3相 CTA-Ⅱ（3歳以上）	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ピラルビシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m² 45 mg/m² 12 mg 30 mg 45 mg/㎡	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day6-12	12日
AML-20 寛解導入療法1　ECM(3歳以上)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	150 mg/㎡ 5 mg/㎡ 200 mg/㎡ 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日
少量シタラビン療法	急性骨髄性白血病	シタラビン	3 mg/kg	静注： day1-3	3日

FLAG療法	急性骨髄性白血病（再発）	フルダラビン	30 mg/m²	点滴静注： day1-5	28日
		シタラビン	2000 mg/m²	点滴静注： day1-5	
FLAG-Ida療法	急性骨髄性白血病（再発）	フルダラビン	30 mg/m²	点滴静注： day1-5	28日
		イダルビシン	8 mg/m²	点滴静注： day1-3	
		シタラビン	2000 mg/m²	点滴静注： day1-5	
Low dose VP+AraC療法	白血病（難治）	シタラビン	20 mg/m²	点滴静注： day1-7	7日
		エトポシド	30 mg/m²	点滴静注： day1-7	
CHOP療法	悪性リンパ腫	ビンクリスチン	1.4 mg/㎡	静注： day1	21日
		ドキソルビシン	50 mg/㎡	点滴静注： day1	
		シクロホスファミド	750 mg/㎡	点滴静注： day1	
		プレドニゾロン	40or60 mg/㎡	経口投与： day1-5	
ICE療法	悪性リンパ腫	エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day1-3	21日
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注： day2	
		イホスファミド	5000 mg/㎡	点滴静注： day2	
B-NHL03 コースP（3歳以上）	非ホジキンリンパ腫	ビンクリスチン	1 mg/m²	静注： day3	7日
		シクロホスファミド	150 mg/m²	点滴静注： day4-6	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
B-NHL03 コース2A（3歳以上）	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート	3000 mg/m²	点滴静注： day1	7日
		ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day2	
		シクロホスファミド	250 mg/m²	点滴静注： day2-4	
		ピラルビシン	30 mg/m²	点滴静注： day3,4	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
B-NHL03 コース2B（3歳以上）	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート	500 mg/m²	点滴静注： day1	7日
		シタラビン	150 mg/m²	点滴静注： day1-4	
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
ALCL99コースP（3歳以上）	非ホジキンリンパ腫	シクロホスファミド	200 mg/m²	点滴静注： day1, 2	5日
		メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	
		シタラビン	30 mg	髄注： day1	
ALCL99コースAM	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート	3 g/㎡	点滴静注： day1	21日
		L-アスパラギナーゼ	15 mg/㎡	静注： day2,3	
		イホスファミド	800 mg/㎡×3	点滴静注： day1-5	
		シタラビン	150 mg/㎡×3	点滴静注： day4,5	
		エトポシド	100 mg/㎡	点滴静注： day4,5	
LCH-12 寛解導入相A	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン	100 mg/m²	点滴静注： day1-5,15-19,29-33	42日
		ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1,15,29	
LCH-12 早期維持相A-a	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン	150 mg/m²	点滴静注： day1	7日
		ビンクリスチン	1.5 mg/m²	静注： day1	

LCH-12 早期維持相A-b	ランゲルハンス細胞組織球症	メトトレキサート ビンクリスチン	20 mg/m² 1.5 mg/m²	静注： day1 静注： day1	7日
LCH-12 後期維持相C-a	ランゲルハンス細胞組織球症	ビンブラスチン メルカプトプリン	6 mg/m² 30 mg/m²	静注： day1 経口投与： day1-14	14日
HLH-2004 初期治療相 週2回（1-2週目）	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m²	点滴静注： day1,4	7日
HLH-2004 初期治療相 週1回（3-8週目）	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m²	点滴静注： day1	7日
AZA点滴静注療法	骨髄異形成症候群	アザシチジン	75 mg/m²	点滴静注： day1-7	28日
ICE療法	固形腫瘍	エトポシド カルボプラチン イホスファミド	100 mg/m² 400 mg/m² 1800 mg/m²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,2 点滴静注： day1-5	21日
JEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド カルボプラチン ブレオマイシン	120 mg/m² 600 mg/m² 15 mg/m²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day2 静注： day3	21日
PEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	100 mg/m² 20 mg/m² 15 mg/m²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 点滴静注： day1	21日
PEB療法（10kg未満）	胚細胞腫瘍	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	3 mg/kg 0.7 mg/kg 0.5 mg/kg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 静注： day1	21日
DD-4A療法（BW30kg未満）	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ビンクリスチン ビンクリスチン ドキソルビシン ドキソルビシン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg 1.5 mg/kg 1 mg/kg	静注： day1,38,80,122,164 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122,143,164 静注： day17,59 静注： day101,143	168日
EE-4A療法（BW30kg未満）	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ビンクリスチン ビンクリスチン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg	静注： day1,17,38,59,80,101,122 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122	126日
DXR+IFM療法	軟部腫瘍	ドキソルビシン イホスファミド	30 mg/㎡ 2000 mg/㎡	点滴静注： day1,2 点滴静注： day1-5	21日
Low-dose CITA療法（JPLT新標準リスク）	肝芽腫	シスプラチン ピラルビシン	80 mg/m² 30 mg/m²	点滴静注： day1 点滴静注： day2,3	21日
James療法	神経芽腫	ビンクリスチン シクロホスファミド	1.5 mg/m² 300 mg/m²	静注： day1 点滴静注： day8	14日
RTX療法	難治性ネフローゼ症候群	リツキシマブ	375 mg/m²	点滴静注： day1,8,15,22	28日
エンドキサンパルス療法	全身性エリテマトーデス	シクロホスファミド	500 mg/m²	点滴静注： day1	30日
インフリキシマブ療法	潰瘍性大腸炎	インフリキシマブ	5 mg/kg	点滴静注： day1,15,43　以後8週間隔	