

◇ 小児科レジメン ◇

2025年10月 現在

レジメン名	適応癌種等	薬剤名	投与量	投与経路： 施行日	1 クール
Triple-IT ALL（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 26 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT ALL（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
MTX-IT ALL(3歳以上9歳未満)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	5日
MTX-IT ALL(9歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	15 mg	髄注： day1	5日
ALL 先行治療相（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	8 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	10 mg	髄注： day1	7日
ALL 先行治療相（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート	12 mg	髄注： day1	7日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（1歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（2歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 10 mg 26 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA4（1歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日

ALL-B12 寛解導入療法IA4（2歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 10 mg 26 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 寛解導入療法IA4（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B12 早期強化療法IB（1歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 8 mg 20 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB（2歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 10 mg 26 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B12 早期強化療法IB+L（2歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 5000 U/m ² 75 mg/m ² 10 mg 26 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	42日
ALL-B12 早期強化療法IB+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 5000 U/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日

ALL-B12 早期強化療法IB+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 5000 U/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	静注： day15,22 点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	42日
ALL-B12 強化療法M2 (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m ² 8 mg 20 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M2 (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m ² 10 mg 26 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2000 mg/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 8 mg 20 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 10 mg 26 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法M5+L (2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 12500 U/m ² 10 mg 26 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日

ALL-B12 強化療法M5+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート ピンクリスチン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 1.5 mg/m ² 12500 U/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 強化療法HR3 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン エトポシド エトポシド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² ×2 100 mg/m ² 100 mg/m ² ×2 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 点滴静注： day3 点滴静注： day4,5 筋注： day6,11 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-B12 強化療法HR2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド イホスファミド ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	3 mg/m ² 5000 mg/m ² 800 mg/m ² 800 mg/m ² ×2 30 mg/m ² 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 点滴静注： day5 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-B12 強化療法HR1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン シクロホスファミド シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 5000 mg/m ² 2000 mg/m ² ×2 200 mg/m ² 200 mg/m ² ×2 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ (1歳)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルビシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 8 mg 20 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日

ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ（2歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 10 mg 26 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L（2歳）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 10 mg 26 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	35日
ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+L（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	28日

ALL-B12 再寛解導入療法Ⅲ+VL (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11,15,18,22,25 点滴静注： day15 静注： day17-20,24-27 髄注： day17,24 髄注： day17,24 経口投与： day15-28	35日
ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	8 mg 20 mg 20 mg/m ² 50 mg/m ²	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク2歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	10 mg 26 mg 20 mg/m ² 50 mg/m ²	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 中間維持療法IM (中間リスク3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	12 mg 30 mg 20 mg/m ² 50 mg/m ²	髄注： day1,29 髄注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 中間維持療法IM+VD	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 20 mg/m ² 50 mg/m ²	静注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B12 維持療法Mainte+VD	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 20 mg/m ² 50 mg/m ²	静注： day1,29 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	56日
ALL-B12 維持療法 (ハイリスク アームB 3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート メルカプトプリン	12 mg 30 mg 20 mg/m ² 50 mg/m ²	髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1,8,15,22,29,36,43,50 経口投与： day1-56	56日
ALL-B19 寛解導入療法IA2 (1歳)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルピシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日

ALL-B19 寛解導入療法IA2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B19 寛解導入療法IA2（3歳以上）PEG-ASP	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビン ベグアスバルガーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 2500 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8 点滴静注： day5 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B19 寛解導入療法IA4（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-B19 早期強化療法IB（1歳）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトブリン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 8 mg 20 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24 経口投与： day1-28	35日
ALL-B19 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メルカプトブリン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 60 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 経口投与： day1-28 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日
ALL-B19 強化療法M（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3 g/m ² 8 mg 20 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day1,8 髄注： day1,8	14日
ALL-B19 強化療法M（3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3 g/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day1,8 髄注： day1,8	14日
ALL-B19 強化療法M2（1歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトブリン	2 g/m ² 8 mg 20 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B19 強化療法M2（2歳）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトブリン	2 g/m ² 10 mg 26 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日

ALL-B19 強化療法M2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	2 g/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B19 強化療法M5 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-B19 再寛解導入療法II A	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ドキソルビシン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 10000 U/m ²	静注： day8,15,22,29 点滴静注： day8,15,22,29 筋注： day8,11,15,18	35日
ALL-B19 再寛解導入療法II A PEG-ASP	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ドキソルビシン ベグアスバルガーゼ	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 2500 U/m ²	静注： day8,15,22,29 点滴静注： day8,15,22,29 点滴静注： day8	35日
ALL-B19 再寛解導入療法II B (2歳)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メルカプトプリン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 60 mg/m ² 10 mg 26 mg	点滴静注： day1 静注： day3-6,10-13 経口投与： day1-day14 髄注： day3,10 髄注： day3,10	28日
ALL-B19 再寛解導入療法II B (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド シタラビン メルカプトプリン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 60 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1 静注： day3-6,10-13 経口投与： day1-day14 髄注： day3,10 髄注： day3,10	28日
ALL-B19Erw-ASP	急性リンパ性白血病	クリサントスパーゼ	10000 U/m ²	筋注： day1	2日
ALL-T11 寛解導入療法IA (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 筋注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALL-T11 早期強化療法IB+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 5000 U/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日
ALL-T11 強化療法M+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5000 mg/m ² 12500 U/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 筋注： day10,24,38,52 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALL-T11 強化療法NEL 全年齢	急性リンパ性白血病	ネララビン	650 mg/m ²	点滴静注： day1-5	7日

ALL-T11 強化療法HR3 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シタラビン エトポシド エトポシド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² × 2 100 mg/m ² 100 mg/m ² × 2 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注 : day1,2 点滴静注 : day3 点滴静注 : day4,5 筋注 : day6,11 髄注 : day5 髄注 : day5	14日
ALL-T11 強化療法HR2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド イホスファミド ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	3 mg/m ² 5000 mg/m ² 800 mg/m ² 800 mg/m ² × 2 30 mg/m ² 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注 : day1,6 点滴静注 : day1 点滴静注 : day2 点滴静注 : day3,4 点滴静注 : day5 筋注 : day6,11 髄注 : day1 髄注 : day1	14日
ALL-T11 強化療法HR1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン シクロホスファミド シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 5000 mg/m ² 2000 mg/m ² × 2 200 mg/m ² 200 mg/m ² × 2 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注 : day1,6 点滴静注 : day1 点滴静注 : day5 点滴静注 : day2 点滴静注 : day3,4 筋注 : day6,11 髄注 : day1 髄注 : day1	14日
ALL-T11 再寛解導入療法II A+L (全年齢)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ドキシルビン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 10000 U/m ²	静注 : day8,15,22,29 点滴静注 : day8,15,22,29 筋注 : day8,11,15,18	35日
ALL-T11 再寛解導入療法II B+L (3歳以上)	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトブリン	1000 mg/m ² 10000 U/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	点滴静注 : day1 筋注 : day1,4,8,11 静注 : day3-6,10-13 髄注 : day3,10 髄注 : day3,10 経口投与 : day1-14	14日
ALL-T19 寛解導入療法IA (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注 : day1,8,15,22 点滴静注 : day1,8,15,22 筋注 : day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注 : day5,26 髄注 : day5,26	28日

ALL-T19 早期強化療法IB（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ シタラビン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 5000 U/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,29 筋注： day3,6,10,13,17,20,24,27 静注： day3-6,10-13,17-20,24-27 髄注： day10,24 髄注： day10,24	35日
ALL-T19 強化療法NEL（全年齢）	急性リンパ性白血病	ネララビン	650 mg/m ²	点滴静注： day1- 5	7日
ALL-T19 強化療法HR3（3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン エトポシド エトポシド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² ×2 100 mg/m ² 100 mg/m ² ×2 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 点滴静注： day3 点滴静注： day4,5 筋注： day6,11 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-T19 強化療法HR2（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド イホスファミド ダウノルピシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	3 mg/m ² 5000 mg/m ² 800 mg/m ² 800 mg/m ² ×2 30 mg/m ² 25000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day2 点滴静注： day3,4 点滴静注： day5 筋注： day6,11 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-Ph13 再寛解導入療法III（3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ドキシソルピシン L-アスパラギナーゼ シクロホスファミド シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトブリン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 10000 U/m ² 500 mg/m ² 75 mg/m ² 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,4,8,11 点滴静注： day22 静注： day24-27,31-34 髄注： day24,31 髄注： day24,31 経口投与： day22-35	42日
JACLS ALL-02 強化療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン シクロホスファミド ピラルピシン メトトレキサート シタラビン	100 mg/m ² 500 mg/m ² 25 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,3,5 点滴静注： day1,2 髄注： day1,8 髄注： day1,8	28日
JACLS ALL-02 聖域療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,8 髄注： day2,9 髄注： day2,9	14日

JACLS ALL-02 再寛解導入療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルビシン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 500 mg/m ² 6000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15 点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 筋注： day1,3,5,8,10,12 髄注： day1 髄注： day1	21日
JACLS ALL-02 再地固め療法（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	シタラビン シクロホスファミド ビラルビシン メトトレキサート シタラビン	100 mg/m ² 500 mg/m ² 25 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,3,5 点滴静注： day1,2 髄注： day1,8 髄注： day1,8	28日
JACLS ALL-02 維持療法#1（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	150 mg/m ² 12 mg 30 mg 50 mg/m ²	静注： day1,15,29 髄注： day1,15,29 髄注： day1,15,29 経口投与： day1-28	42日
JACLS ALL-02 維持療法#2（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン シクロホスファミド L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m ² 600 mg/m ² 10000 U/m ²	静注： day1,8,15 点滴静注： day8 筋注： day1,8,15	28日
JACLS ALL-02 維持療法#3（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	150 mg/m ² 12 mg 30 mg 50 mg/m ²	静注： day1,15,29 髄注： day29 髄注： day29 経口投与： day1-28	42日
JACLS ALL-02 維持療法#4（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン ビラルビシン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m ² 25 mg/m ² 10000 U/m ²	静注： day1,8,15 点滴静注： day8 筋注： day1,8,15	28日
JACLS ALL-02 維持療法#5（ハイリスク3歳以上）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メルカプトプリン	150 mg/m ² 50 mg/m ²	静注： day1,15,29 経口投与： day1-28	42日
MLL-10 早期強化療法B（3ヶ月以上1歳未満）	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	400 mg/m ² 3600 mg/m ² 300 mg/m ² 100 mg/m ² 3000 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 6000 U/m ² 6 mg 15 mg	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 点滴静注： day15-19 点滴静注： day15-19 点滴静注： day29,31 点滴静注： day30 筋注： day31 髄注： day1,8 髄注： day1,8	35日

MLL-10 維持療法B- I サイクル#1,3,5 (1歳)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	0.05 mg/kg 20 mg/m ² 8 mg 20 mg 75 mg/m ²	静注： day1 静注： day8,15,22 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day8-28	28日
MLL-10 維持療法B- I サイクル#2,4 (1歳)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	0.05 mg/kg 20 mg/m ² 300 mg/m ² 100 mg/m ² 3000 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 6000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1 静注： day8,15 点滴静注： day22-26 点滴静注： day22-26 点滴静注： day43,45 点滴静注： day44 筋注： day45 髄注： day1 髄注： day1	49日
MLL-10 後期強化療法B (1歳)	急性リンパ性白血病	メトトレキサート メトトレキサート シクロホスファミド エトポシド シタラビン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	400 mg/m ² 3600 mg/m ² 300 mg/m ² 100 mg/m ² 3000 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 6000 U/m ² 8 mg 20 mg	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 点滴静注： day15-19 点滴静注： day15-19 点滴静注： day29,31 点滴静注： day30 筋注： day31 髄注： day1 髄注： day1	42日
MLL-10 維持療法B- II (2歳)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート メルカプトプリン	0.05 mg/kg 10 mg 20 mg/m ² 75 mg/m ²	静注： day1,29,57 髄注： day1 経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78 経口投与： day8-28,36-56,64-84	84日
MLL-10 維持療法B- II (3歳以上)	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メトトレキサート メトトレキサート メルカプトプリン	0.05 mg/kg 12 mg 20 mg/m ² 75 mg/m ²	静注： day1,29,57 髄注： day1 経口投与： d8,15,22,36,43,50,64,71,78 経口投与： day8-28,36-56,64-84	84日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 10000 U/m ² 6 mg 16 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日

ALL-R08 寛解導入療法F1 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 10000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 10000 U/m ² 10 mg 26 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 10000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 6 mg 16 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 8 mg 20 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 10 mg 26 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日
ALL-R08 寛解導入療法F2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1 点滴静注： day1,2 点滴静注： day4 髄注： day5 髄注： day5	14日

ALL-R08 強化療法R1 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 2000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 6 mg 16 mg 100 mg/m ²	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 2000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 8 mg 20 mg 100 mg/m ²	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 2000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 10 mg 26 mg 100 mg/m ²	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン メトトレキサート シタラビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1.5 mg/m ² 1000 mg/m ² 2000 mg/m ² × 2 10000 U/m ² 12 mg 30 mg 100 mg/m ²	静注： day1,6 点滴静注： day1 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (1歳未満)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルピシン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m ² 1000 mg/m ² 400 mg/m ² 35 mg/m ² 10000 U/m ² 6 mg 16 mg 100 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日

ALL-R08 強化療法R2 (1歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m ² 1000 mg/m ² 400 mg/m ² 35 mg/m ² 10000 U/m ² 8 mg 20 mg 100 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (2歳)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m ² 1000 mg/m ² 400 mg/m ² 35 mg/m ² 10000 U/m ² 10 mg 26 mg 100 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R08 強化療法R2 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ビンデシン メトトレキサート イホスファミド ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	3 mg/m ² 1000 mg/m ² 400 mg/m ² 35 mg/m ² 10000 U/m ² 12 mg 30 mg 100 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 点滴静注： day5 点滴静注： day6 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-5	14日
ALL-R3 寛解導入療法 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	ピンクリスチン ミトキサントロン ベグアスパルガーゼ メトトレキサート	1.5 mg/m ² 10 mg/m ² 1000 U/m ² 12 mg	静注： day3,10,17,24,31 点滴静注： day1,2 点滴静注： day3,17 髄注： day1,8	35日
ALL-R3 強化療法1 (3歳以上)	急性リンパ性白血病 (再発)	メトトレキサート ベグアスパルガーゼ シクロホスファミド エトポシド メトトレキサート	1 g/m ² 1000 U/m ² 440 mg/m ² 100 mg/m ² 12 mg	点滴静注： day1 点滴静注： day3 点滴静注： day8-12 点滴静注： day8-12 髄注： day1	14日
AALL1331 conti.1/2 d1-d42	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メルカプトプリン メトトレキサート メトトレキサート	1.5 mg/m ² 75 mg/m ² 20 mg/m ² 25 mg/m ² × 4	静注： day1 経口投与： day1-42 経口投与： day8,15,29,36 経口投与： day22	42日
AALL1331 conti.1/2 d43-d56	急性リンパ性白血病	シクロホスファミド エトポシド シタラビン メルカプトプリン	300 mg/m ² 150 mg/m ² 50 mg/m ² 75 mg/m ²	点滴静注： day1,8 点滴静注： day1,8 静注： day2-5,9-12 経口投与： day1-7	14日

AALL1331 maintenance	急性リンパ性白血病	ピンクリスチン メルカプトプリン メトトレキサート	1.5 mg/m ² 75 mg/m ² 20 mg/m ²	点滴静注： day1,29,57 経口投与： day1-84 経口投与： day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78	84日
hyper CVAD療法（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシソルビシン メトトレキサート シタラビン	2 mg/m ² 300 mg/m ² × 2 50 mg/m ² 12 mg 30 mg	静注： day4,11 点滴静注： day1-3 点滴静注： day4 髄注： day1 髄注： day1	21日
HD-MTX+AraC療法（3歳以上）	急性リンパ性白血病（再発）	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	1000 mg/m ² 3000 mg/m ² × 2 12 mg 30 mg 60 mg/m ²	点滴静注： day1 点滴静注： day2,3 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day1-21	21日
Clofarabine+VP+CY療法	急性リンパ性白血病（再発）	クロファラビン エトポシド シクロホスファミド	40 mg/m ² 100 mg/m ² 440 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5	28日
ブリナツモマブ療法（45kg以上）（1サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	9 μg 28 μg	点滴静注： day1-7 点滴静注： day8-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg以上）（2-5サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	28 μg	点滴静注： day1-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg未満）（1サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	5 μg/m ² 15 μg/m ²	点滴静注： day1-7 点滴静注： day8-28	42日
ブリナツモマブ療法（45kg未満）（2-5サイクル目）	再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	15 μg	点滴静注： day1-28	42日
FLU+MEL180療法	造血幹細胞移植前処置	メルファラン フルダラビン	90 mg/m ² 30 mg/m ²	点滴静注： day3,4 点滴静注： day1-5	10日
FLU+BU+CY療法	移植前処置	フルダラビン ブスルファン シクロホスファミド	25 mg/m ² 4 mg/kg(9kg未満) 4.8 mg/kg(9kg以上16kg未満) 4.4 mg/kg(16kg以上23kg以下) 3.8 mg/kg(23kg超34kg以下) 3.2 mg/kg(34kg超) 14.5 mg/kg	点滴静注： day2-6 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day1-4 点滴静注： day5-6	6日
Short-term MTX療法	移植後GVHD予防	メトトレキサート メトトレキサート	15 mg/m ² 10 mg/m ²	静注： day1 静注： day3,6,11	11日
PTCY療法	移植後GVHD予防	シクロホスファミド	50 mg/kg	点滴静注： day1-2	2日
Low-dose MTX療法	移植後GVHD治療	メトトレキサート	10 mg/m ²	静注： day1	3日
Triple-IT AML（3ヶ月未満）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	3 mg 6 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（3ヶ月以上1歳未満）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	6 mg 15 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML（1歳）	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	8 mg 20 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日

Triple-IT AML (2歳)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	10 mg 25 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
Triple-IT AML (3歳以上)	急性骨髄性白血病	メトトレキサート シタラビン	12 mg 30 mg	髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 寛解導入療法1A ECM (3ヶ月未満)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	3.3 mg/kg 0.11 mg/kg 4.4 mg/kg 3 mg 6 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日
AML-12 寛解導入療法1A ECM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	3.3 mg/kg 0.11 mg/kg 4.4 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	12日
AML-12 寛解導入療法1A ECM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	150 mg/m ² 5 mg/m ² 200 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 髄注： day1 髄注： day1	28日
AML-12 寛解導入療法2 HCE I (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	100 mg/kg × 2 0.33 mg/kg 3.3 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 寛解導入療法2 HCE I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m ² × 2 10 mg/m ² 100 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法1 HCM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	66.7 mg/kg × 2 0.17 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法1 HCM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² × 2 5 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日

AML-12 強化療法2 HCE I (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	100 mg/kg×2 0.33 mg/kg 3.3 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法2 HCE I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルビシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m ² ×2 10 mg/m ² 100 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法3 HCM (3ヶ月以上1歳未満)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	66.7 mg/kg×2 0.17 mg/kg 6 mg 15 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-12 強化療法3 HCM (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² ×2 5 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 髄注： day1 髄注： day1	5日
AML-P05 寛解導入療法第1相 ACD (2歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ダウノマイシン トレチノイン	200 mg/m ² 45 mg/m ² 45 mg/m ²	点滴静注： day8-14 点滴静注： day8-10 経口投与： day1-35	35日
AML-P05 寛解導入療法第2相 HCMA-I (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m ² ×2 10 mg/m ² 12 mg 30 mg 45 mg/m ²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第1相 HCMA- II (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	3000 mg/m ² ×2 10 mg/m ² 12 mg 30 mg 45 mg/m ²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day4-10	10日
AML-P05 強化療法第2相 CTA- I (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ビラルビシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m ² 45 mg/m ² 12 mg 30 mg 45 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 髄注： day1 髄注： day1 経口投与： day6-12	12日

AML-P05 強化療法第3相 CTA-II (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	シタラビン ビラルピシン メトトレキサート シタラビン トレチノイン	200 mg/m ² 45 mg/m ² 12 mg 30 mg 45 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1 随注： day1 随注： day1 経口投与： day6-12	12日
AML-P17 寛解導入療法 SR	急性前骨髄球性白血病	トリセノックス トレチノイン	0.15 mg/kg 25 mg/m ² /day	点滴静注： day1-60 経口投与： day1-60	60日
AML-P17 維持療法 (3歳以上)	急性前骨髄球性白血病	トリセノックス シタラビン トレチノイン	0.15 mg/kg 30 mg 25 mg/m ² /day	点滴静注： day1-5,8-12,15-19,22-26 随注： day1 経口投与： day1-14,29-42	56日 4クール目 は28日
AML-20 寛解導入療法1 ECM(3歳以上)	急性骨髄性白血病	エトポシド ミトキサントロン シタラビン メトトレキサート シタラビン	150 mg/m ² 5 mg/m ² 200 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day6-10 点滴静注： day6-12 随注： day1 随注： day1	12日
AML-20 寛解導入療法2 HCE I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダマイシン エトポシド メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m ² /回 10 mg/m ² 100 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3、1日2回 点滴静注： day1 点滴静注： day1-5 随注： day1 随注： day1	5日
AML-20 強化療法1 HCM(3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン ミトキサントロン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² /回 5 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5、1日2回 点滴静注： day1-3 随注： day1 随注： day1	5日
AML-20 強化療法2 HC I (3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン イダルピシン メトトレキサート シタラビン	3000 mg/m ² /回 10 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-3、1日2回 点滴静注： day1 随注： day1 随注： day1	3日
AML-20 強化療法3 HC(3歳以上)	急性骨髄性白血病	シタラビン メトトレキサート シタラビン	2000 mg/m ² /回 12 mg 30 mg	点滴静注： day1-5、1日2回 随注： day1 随注： day1	5日
少量シタラビン療法	急性骨髄性白血病	シタラビン	3 mg/kg	静注： day1-3	3日
FLAG療法	急性骨髄性白血病 (再発)	フルダラビン シタラビン	30 mg/m ² 2000 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5	28日
FLAG-Ida療法	急性骨髄性白血病 (再発)	フルダラビン イダルピシン シタラビン	30 mg/m ² 8 mg/m ² 2000 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-3 点滴静注： day1-5	28日
Low dose VP+AraC療法	白血病 (難治)	シタラビン エトポシド	20 mg/m ² 30 mg/m ²	点滴静注： day1-7 点滴静注： day1-7	7日

CHOP療法	悪性リンパ腫	ビンクリスチン ドキシソルピシン シクロホスファミド ブレドニゾロン	1.4 mg/m ² 50 mg/m ² 750 mg/m ² 40or60 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day1 経口投与： day1-5	21日
ICE療法	悪性リンパ腫	エトポシド カルボプラチン イホスファミド	100 mg/m ² 5 AUC 5000 mg/m ²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day2 点滴静注： day2	21日
OEPA療法	ホジキンリンパ腫	ビンクリスチン エトポシド ドキシソルピシン ブレドニゾロン	1.5 mg/m ² 125 mg/m ² 40 mg/m ² 60 mg/m ² (最大80mg)	点滴静注： day1,8,15 点滴静注： day2-6 点滴静注： day1,15 経口投与： day1-15(day16-22で漸減)	28日
B-NHL03 コースP (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	ビンクリスチン シクロホスファミド メトトレキサート	1 mg/m ² 150 mg/m ² 12 mg	静注： day3 点滴静注： day4-6 髄注： day1	7日
B-NHL03 コース2A (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート ビンクリスチン シクロホスファミド ピラルピシン メトトレキサート	3000 mg/m ² 1.5 mg/m ² 250 mg/m ² 30 mg/m ² 12 mg	点滴静注： day1 静注： day2 点滴静注： day2-4 点滴静注： day3,4 髄注： day1	7日
B-NHL03 コース2B (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート シタラビン メトトレキサート	500 mg/m ² 150 mg/m ² 12 mg	点滴静注： day1 点滴静注： day1-4 髄注： day1	7日
B-NHL14 B#P:COP (3歳以上)	高リスク成熟B細胞性腫瘍	ビンクリスチン シクロホスファミド メトトレキサート リツキシマブ	1 mg/m ² 300 mg/m ² 15 mg 375 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 髄注： day1 点滴静注： day6	7日
B-NHL14 B#1:R-COPADM (3歳以上)	高リスク成熟B細胞性腫瘍	ビンクリスチン メトトレキサート シクロホスファミド ドキシソルピシン メトトレキサート リツキシマブ	2 mg/m ² 3 g/m ² 250 mg/m ² 60 mg/m ² 15 mg 375 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1 点滴静注： day2-4 点滴静注： day2 髄注： day2,6 点滴静注： day1	13日
ALCL99コースP (3歳以上)	非ホジキンリンパ腫	シクロホスファミド メトトレキサート シタラビン	200 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1,2 髄注： day1 髄注： day1	5日
ALCL99コースAM	非ホジキンリンパ腫	メトトレキサート L-アスパラギナーゼ イホスファミド シタラビン エトポシド	3 g/m ² 15 mg/m ² 800 mg/m ² ×3 150 mg/m ² ×3 100 mg/m ²	点滴静注： day1 静注： day2,3 点滴静注： day1-5 点滴静注： day4,5 点滴静注： day4,5	21日

ALB-NHL-14寛解導入療法（3歳以上）	リンパ芽球性リンパ腫	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALB-NHL-14早期強化療法（3歳以上）	リンパ芽球性リンパ腫	ピンクリスチン ダウノルビン L-アスパラギナーゼ メトトレキサート シタラビン	1.5 mg/m ² 30 mg/m ² 5000 U/m ² 12 mg 30 mg	静注： day1,8,15,22 点滴静注： day1,8,15,22 点滴静注： day5,8,11,14,17,20,23,26 髄注： day5,26 髄注： day5,26	28日
ALB-NHL-14CNS予防療法（3歳以上）	リンパ芽球性リンパ腫	メトトレキサート メトトレキサート シタラビン メルカプトプリン	5 g/m ² 12 mg 30 mg 25 mg/m ²	点滴静注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 髄注： day8,22,36,50 経口投与： day1-56	70日
ALB-NHL-14再寛解導入療法	リンパ芽球性リンパ腫	ピンクリスチン ドキソルビン L-アスパラギナーゼ	1.5 mg/m ² (最大2mg) 30 mg/m ² (最大60mg) 10000 U/m ²	静注： day8,15,22,29 点滴静注： day8,15,22,29 筋注： day8,11,15,18	35日
ALB-NHL-14後期強化療法（3歳以上）	リンパ芽球性リンパ腫	シクロホスファミド シタラビン メルカプトプリン メトトレキサート シタラビン	1000 mg/m ² 75 mg 60 mg/m ² 12 mg 30 mg	点滴静注： day1 髄注： day3-6,10-13 経口投与： day1-14 髄注： day3,10 髄注： day3,10	14日
LCH-12 寛解導入相A	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ピンクリスチン	100 mg/m ² 1.5 mg/m ²	点滴静注： day1-5,15-19,29-33 静注： day1,15,29	42日
LCH-12 早期維持相A-a	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ピンクリスチン	150 mg/m ² 1.5 mg/m ²	点滴静注： day1 静注： day1	7日
LCH-12 早期維持相A-b	ランゲルハンス細胞組織球症	メトトレキサート ピンクリスチン	20 mg/m ² 1.5 mg/m ²	静注： day1 静注： day1	7日
LCH-12 早期維持相A-a【VCR点滴】	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ピンクリスチン	150 mg/m ² 1.5 mg/m ²	点滴静注： day1 点滴静注： day1	7日
LCH-12 早期維持相A-b【VCR点滴】	ランゲルハンス細胞組織球症	メトトレキサート ピンクリスチン	20 mg/m ² 1.5 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1	7日
LCH-12 後期維持相C-a	ランゲルハンス細胞組織球症	ピンブラスチン メルカプトプリン	6 mg/m ² 30 mg/m ²	静注： day1 経口投与： day1-14	14日
LCH-19 初期治療相A	ランゲルハンス細胞組織球症	シタラビン ピンクリスチン	100 mg/m ² 1.5 mg/m ²	点滴静注： day1-5,15-19,29-33 静注： day1,15,29	42日
LCH-19 維持相I+z-a	ランゲルハンス細胞組織球症	ピンクリスチン シタラビン	1.5 mg/m ² 150 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day1	7日
LCH-19 維持相I+z-bz	ランゲルハンス細胞組織球症	メトトレキサート	20 mg/m ²	静注： day1	7日
HLH-2004 初期治療相 週2回（1-2週目）	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m ²	点滴静注： day1,4	7日
HLH-2004 初期治療相 週1回（3-8週目）	血球貪食性リンパ組織球症	エトポシド	150 mg/m ²	点滴静注： day1	7日
AZA点滴静注療法	骨髓異形成症候群	アザシチジン	75 mg/m ²	点滴静注： day1-7	28日

ICE療法	固形腫瘍	エトポシド カルボプラチン イホスファミド	100 mg/m ² 400 mg/m ² 1800 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1,2 点滴静注： day1-5	21日
JEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド カルボプラチン ブレオマイシン	120 mg/m ² 600 mg/m ² 15 mg/m ²	点滴静注： day1-3 点滴静注： day2 静注： day3	21日
PEB療法	胚細胞腫瘍	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	100 mg/m ² 20 mg/m ² 15 mg/m ²	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 点滴静注： day1	21日
PEB療法（10kg未満）	胚細胞腫瘍	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	3 mg/kg 0.7 mg/kg 0.5 mg/kg	点滴静注： day1-5 点滴静注： day1-5 静注： day1	21日
DD-4A療法（BW30kg未満）	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ピンクリスチン ピンクリスチン ドキソルビシン ドキソルビシン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg 1.5 mg/kg 1 mg/kg	静注： day1,38,80,122,164 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122,143,164 静注： day17,59 静注： day101,143	168日
EE-4A療法（BW30kg未満）	ウィルムス腫瘍	アクチノマイシンD ピンクリスチン ピンクリスチン	0.045 mg/kg 0.05 mg/kg 0.067 mg/kg	静注： day1,17,38,59,80,101,122 静注： day3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 静注： day80,101,122	126日
DXR+IFM療法	軟部腫瘍	ドキソルビシン イホスファミド	30 mg/m ² 2000 mg/m ²	点滴静注： day1,2 点滴静注： day1-5	21日
Low-dose CITA療法（JPLT新標準リスク）	肝芽腫	シスプラチン ビラルビシン	80 mg/m ² 30 mg/m ²	点滴静注： day1 点滴静注： day2,3	21日
James療法	神経芽腫	ピンクリスチン シクロホスファミド	1.5 mg/m ² 300 mg/m ²	静注： day1 点滴静注： day8	14日
RTX療法	難治性ネフローゼ症候群	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注： day1,8,15,22	28日
エンドキサンパルス療法	全身性エリテマトーデス	シクロホスファミド	500 mg/m ²	点滴静注： day1	30日
インフリキシマブ療法	潰瘍性大腸炎	インフリキシマブ	5 mg/kg	点滴静注： day1,15,43 以後8週間隔	